



טיפול במפגע "יתוש הנמר האסייתי"

יתוש הטיגריס האסייתי הוא מין פולש הנפוץ באזורים רבים בארץ. היתוש פעיל הן בשעות האור והן בשעות החשכה וגורם למטרדי עקיצות קשים.

יתוש הטיגריס האסייתי נחשב לאחד המינים הטורדנים ביותר לאדם. נקבת יתוש אחת יכולה לגרום למספר רב של עקיצות בתוך זמן קצר ולעקיצות גם דרך בגדים דקים ואף דרך השיער. כמו כן התגובה האלרגית (גירוד, אדמומיות ונפיחות) של רוב האנשים לעקיצה של יתוש הטיגריס האסייתי, חריפה יותר מאשר התגובה לעקיצות של יתושים אחרים.

ברחבי הארץ נפוץ היתוש לאורך מישור החוף - מראש הנקרה ועד אשקלון; בכרמל ומורדותיו; בשפלה הפנימית; באזור השרון; במערב השומרון; בגוש דן; בשפלת יהודה ובהרי יהודה, כולל בירושלים ובאזור באר שבע.



יתוש הטיגריס האסייתי

דרכי התפשטות של יתוש הטיגריס האסייתי

עיקר ההתפשטות של יתוש זה בארץ היא באמצעות העברת ביצים ו/או זחלים במים שמצטברים בתוך עציצים, נקבים בהם מצטברת לחות, תחתיות דליים ומכלים.

ההתמודדות : איתור וסילוק מקורות מים עומדים

היות ולא ניתן כלל לרסס את היתוש הבוגר באוויר כי חומרי ההדברה רעילים ומזיקים גם לבני האדם, לפיכך דרך הטיפול היא למנוע את דגירתם של היתושים. לכן, יש לבדוק ביסודיות את הבית, החצר והגינה לפחות פעם בשבוע, ולאתר כל מקור להצטברות מים עומדים (לדוגמא: דלי העומד מתחת לניקוז של מזגן, כלי מים של בעלי חיים, מים המצטברים בעציצים תחתיות עציצים ואדניות). לתקן נזילות של מים מצינורות, מזגנים.

להימנע מהשקיית יתר הגורמת להצטברות מים עומדים. לסלק או לחרר כל כלי קיבול שאינו הכרחי. לאחסן כלי קיבול כגון דליים פחים וכד' כך שלא יוכלו להצטבר בהם מים. לרוקן ולייבש כל כלי קיבול המשמש לאגירת מים ולא ניתן לסלקו כגון תחתיות העציצים, אגרטלים, דליים חביות, כלי מים של בעלי חיים, וכל מיכל אחר לפחות פעם ב - 3 ימים.

דיווח על המפגע

יש לדווח על מטרדי יתושים חדשים או על שינויים בעוצמת המפגעים למוקד המועצה 107. דיווחים אלו חשובים למיפוי וקביעת מגמות התפשטות, משוב להצלחת פעולות, ובסיס טוב לפעולה של כל הנוגעים בדבר.